

PATIENTVEJLEDNING -

HÆMORIDEBEHANDLING V. ELASTIKMETODEN.

En indvendig hæmoride er en frembuling inde i den nederste del af endetarmen af en blodåre(vene) og den slimhinde, der ligger oven på åren. Får de blodfortyndende medicin skal dette oplyses i god tid før operationen.

Før behandlingen

De skal tage et Microlax ca. 2 timer før undersøgelsen.

Behandlingen

Da der ikke er smertesans på indersiden af tarmen, foretages behandlingen uden bedøvelse. Ved elastikmetoden sættes en lille og meget stram elastik hen over hæmoriden/frembulingen. Herved stoppes blodforsyningen til hæmoriden, som derefter ”visner” og falder af sammen med elastikken.

Efter behandlingen

Mod smerter: Der kan det første halve til hele døgn føles stramning og afføringstrang. Hvis det generer, kan man tage et smertestillende håndkøbspræparat (Paracetamol eller evt. Ibuprofen).

Restriktioner: Der er ingen forholdsregler efter indgrebet, og man kan gå normalt på toilettet.

Man kan føle lidt almen utilpashed lige efter behandlingen. ~~Dette går dog hurtigt over.~~

Efter 8-10 dage vil den afsnørede hæmoride falde af og forsvinde sammen med elastikken. Dette observeres normalt ikke, men kan medføre en smule blod i afføringen.

Komplikationer: Der kan opstå blødning de følgende dage samt smerter ved endetarmen.

Søg læge: Ved kraftig blødning, smerter eller feber skal kirurgen, vagtlæge eller skadestue straks kontaktes.